

ผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช สำหรับผักใบและไม้ผล



บาสด้า®-เอ็กซ์ Basta®-X

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม H

ใบแคบ ใบกว้าง กก ตายสนิท ตายนาน

- อัตราใช้ 150 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ระยะปลอดฝน 4-6 ชม.
- สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
- ฉีดพ่นวัชพืชบริเวณร่องพืชประธาน

หลีกเลี่ยง การฉีดกับพืชเล็ก

หลีกเลี่ยง การสัมผัสกับพืชประธานโดยตรง

✓ กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง เถาเลื้อยและกก

✓ ออกฤทธิ์แบบสัมผัส กำจัดวัชพืชได้รวดเร็ว
หญ้าเลื้อยและตายภายใน 3-10 วัน

✓ หญ้าตายจริง ตายนาน

✓ สูตรลิขสิทธิ์จากเยอรมัน ไม่เหมือนใคร

กำจัดวัชพืช



หญ้าปากควาย



หญ้ายับยิบหนว



หญ้าตีนกา



โมยราบ



กกตุ่มหู



หญ้าตีนตุ๊กแก



1 ลิตร



5 ลิตร

ทรีวิกซ์® Treevix®

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม E

- อัตราใช้ 10 กรัม ต่อไร่
- ระยะปลอดฝ่นสั้นเพียง 1 ซม.
- สารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย
- ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืชทั้งทางใบ ราก และต้นอ่อน
- โดดเด่นในการกำจัดวัชพืชเมล็ดใหญ่

คุมได้ ขำได้ เข้าได้กับทุกสูตร



สามารถใช้ร่วมกับ กลูโฟซิเนต และ ไกลโฟเซต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช



ออกฤทธิ์ทั้งคุมและขำ
เร่งให้วัชพืชแสดงอาการไหม้ใน 3-4 วัน



ไม่มีไอระเหย ปลอดภัยกว่าสารกลุ่ม 2,4-D



กำจัดวัชพืช



หนวดปลาดุก



หญ้าขี้มิ้นคืบ



เทียนนา



ไลน



ผักเบี้ยใหญ่



หญ้าหาง



ผักใบม



โขงใบมนหรือจัน



10 กรัม



100 กรัม

พราว®ซีเอส

Prowl®CS

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม K1

- อัตราใช้ 400 ซีซี ต่อไร่
- ระยะปลอดฝนเพียง 1-2 ชม.
- หากเคยพบวัชพืชใบกว้างในพื้นที่ เช่น กก หนวดปลาชุก ผักปอดนา โสน เชง เทียนนา แนะนำ ผสมกับ กรีวัช อัตรา 10 กรัม ต่อไร่

เก่งคุมแห้ง ทนแล้งดี

- ✓ สูตรแคปซูล กลิ่นไม่ฉุน ลดการระเหย
- ✓ ปลอดภัยต่อพืชปลูก สามารถฉีดพ่นได้ทันที หลังปลูกพืชเพื่อคุมวัชพืชงอก
- ✓ โดดเด่นเรื่องการคุมหญ้าใน นาหว่านข้าวแห้ง อ้อยและข้าวโพด



กำจัดวัชพืช



หญ้าปากควาย



หญ้านกสีชมพู



หญ้าดอกขาว



หญ้าตีนตุ๊ก



ผักแครด



ผักปลาบโร



1 ลิตร

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม

ที่บีเอเอสเอฟ แนะนำ

สารกำจัดวัชพืชกลุ่ม 10

ฆ่าหญ้าอย่างมั่นใจ

✓ ไล่ต้งาอีกรั

✓ โดดเด่นรื่องการกำจัดวัชพืช
ทั้งใบแคบและใบกว้าง

อัตราการใช้

200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

 กำจัดวัชพืช



หญ้าไย่ง



หญ้านกสัสมพ



หญ้าดอกขาว



หญ้ายาง



หญ้าตีนตึก



4 ลิตร